

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekonsiliasi obat, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Prevalensi DRP aktual pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Sewon 2 Bantul setelah dilakukan rekonsiliasi obat adalah sebesar 52,78% yang terdiri dari:
  - a. Ketidapatuhan pasien sebesar 21,05%
  - b. *Adverse Drug Reaction* sebesar 78,95%
2. Penanggulangan *drug related problem* aktual pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Sewon 2 Bantul dapat berupa :
  - a. Memberikan konseling dan motivasi kepada pasien agar menumbuhkan kesadaran pasien tentang obat, waktu dan jadwal minum obat, penyakitnya serta manfaat terapi yang dilakukan.
  - b. Memberikan obat tambahan untuk pasien yang mengalami efek samping dari obat antihiperqlikemik.

#### B. Saran

Dengan hasil rekonsiliasi obat yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Apoteker

Perlu adanya konseling dengan pasien mengenai informasi obat, penyakit serta manfaat terapi yang dilakukan.

## 2. Bagi Puskesmas

Diperlukan penerapan proses rekonsiliasi obat untuk mengetahui jenis obat yang dikonsumsi sebelumnya oleh pasien sehingga mampu mengurangi kejadian *drug related problems* aktual yang terjadi.