

GAMBARAN EFIKASI DIRI DAN PEAK EXPIRATORY FLOW RATE PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS (PPOK)

Emdat Suprayitno¹, Azizah Khoiriyati², Titiek Hidayati³

¹Program Studi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Tamantirto, Bantul, Yogyakarta. Email: emdats@yahoo.com

²Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Tamantirto, Bantul, Yogyakarta.

ABSTRACT

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has become a huge public health problem in the world. In Asy-Syaafi Hospital, COPD is the most commonly found disease after bronchitis among the patients in out patient unit of lung disease. Self efficacy showed patients' confidence in independently managing chronic disease. Whether they want or not to start the treatment is determined by their self efficacy. Peak expiratory flow rate showed condition and problems of lung function and the narrowing or blockage of the airway.

Objective: Identify conditions and problems on self efficacy and Peak expiratory flow rate of COPD patients in Asy-Syaafi Hospital Pamekasan, East Java.

Method: This research was descriptive study used non analytic cross sectional design, with total sampling, involving 30 respondents. Data were collected with a questionnaire of the COPD self efficacy (CSES) and peak flow meter. Data analysis was performed with a univariate analysis.

Results: Self efficacy was in low category with score less than 99 (86.7%) and peak expiratory flow rate was less than <50% of the PEF (90%).

Conclusion: Most of COPD self efficacy in Asy-Syaafi Hospital Pamekasan were in not good category and peak expiratory flow rate contained in red zone or the occurrence of major constriction of the airways.

Keywords: COPD, Self Efficacy, Peak Expiratory Flow Rate

PENDAHULUAN

Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) adalah masalah kesehatan secara global yang sejak tahun 2001 merupakan masalah utama dalam kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020 PPOK diperkirakan menempati peringkat kelima di seluruh dunia dalam beban penyakit dan peringkat ketiga dalam kematian⁽¹⁾. Sesak nafas atau dyspnea merupakan masalah yang umum dijumpai pada penderita PPOK⁽²⁾.

Berdasarkan hasil survei penyakit tidak menular oleh direktorat jenderal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan kementerian kesehatan di 5 rumah sakit provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung dan Sumatra Selatan) pada tahun 2004 menunjukkan PPOK menempati urutan pertama penyumbang angka kesakitan yaitu (35%), asma bronkial (33%), kanker paru (30%) dan lainnya (2%)⁽³⁾.

. Berdasarkan profil Rumah Sakit Asy-Syaafi Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 di dapatkan data 10 penyakit terbanyak pada tahun 2013 di unit rawat jalan adalah 577 pasien bronchitis dan 504 pasien PPOK. Data jumlah pasien PPOK di unit rawat inap mencapai 352 pasien yang menjadi jumlah terbanyak kedua setelah tuberculosi yaitu 623 pasien. Jumlah rata-rata pasien PPOK di unit rawat jalan bulan Maret, April dan Mei tahun 2016 mencapai 80 pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang pasien PPOK mereka mengatakan masalah yang sering dialami adalah sesak nafas terkadang batuk disertai dahak dan kadang tanpa dahak. Pasien mengatakan dampak dari PPOK yang diderita mempengaruhi banyak aspek. Satu orang pasien mengatakan sejak satu bulan yang lalu tidak bisa bertani karena batuk yang tidak segera sembuh. Kedua pasien lainnya mengatakan sesak yang dideritanya sangat mengganggu aktifitas sehari-hari seperti pada saat mandi, berjalan dan membersihkan rumah.

Efikasi diri dirancang untuk menguji keyakinan individu untuk melakukan kegiatan yang dipilih sebagai usaha yang diinginkan⁽⁴⁾. Efikasi diri yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup pasien PPOK⁽⁵⁾. Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau *self*

knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari karena efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai suatu tujuan.⁽⁶⁾

Peak expiratory flow rate (PEF) atau arus puncak ekspirasi adalah titik aliran tertinggi yang dicapai seseorang selama ekspirasi maksimal dan titik ini mencerminkan terjadinya perubahan ukuran jalan nafas menjadi besar. Pengukuran ini sangat berkorelasi dan sama dengan *forced expiratory volume in the first second* (FEV1)⁽⁷⁾.

Pasien PPOK memiliki ketidakmampuan mendasar dalam mencapai angka aliran udara normal selama pernafasan terutama pada saat fase ekspirasi⁽⁸⁾. Ketidakmampuan pasien dalam mencapai udara normal disebabkan karena adanya obstruksi pernafasan yang dapat mengakibatkan paru-paru mudah untuk mengempis, sehingga terjadi penurunan aliran puncak ekspirasi atau PEF⁽⁹⁾.

BAHAN DAN CARA PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan *design cross sectional non analitik*. Populasi dalam penelitian ini adalah Pasien PPOK di Poli paru RSUD Asy-Syaafi yang menjalani rawat jalan pada bulan September tahun 2016 sebanyak 30 pasien PPOK dengan *total sampling*. Peneliti

menggunakan lembar *inform consent* sebagai tanda persetujuan dari pihak responden.

Peneliti menggunakan kuesioner COPD *self efficacy scale* (CSES) untuk mengukur efikasi diri yang terdiri dari 33 pertanyaan dan terdapat 4 pilihan jawaban yaitu: 4: Sangat yakin, 3: Yakin, 2: Agak yakin dan 1: Tidak yakin dengan kategori: efikasi diri baik jika skor efikasi diri >99, efikasi diri tidak baik jika skor efikasi diri <99. Instrumen CSES telah dilakukan uji reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* berkisar dari 0,80-0,9⁽¹⁰⁾.

Peneliti menggunakan *Peak flow meter Vitalograph* dengan *standard* kalibrasi ISO 23747:2007 untuk mengukur nilai PEF. Nilai PEF dihitung dengan cara hasil PEF diukur (L/M) dibagi nilai prediksi (L/M) kemudian dikalikan 100% dengan kategori %PEF yaitu: Zona hijau jika nilai persentase PEF mencapai 80% sampai 100% yang menandakan fungsi paru-paru baik. Zona kuning jika nilai persentase PEF mencapai 50% sampai 80% yang menandakan mulai terjadi penyempitan jalan nafas. Zona merah jika persentase PEF kurang dari 50% yang menandakan saluran nafas besar telah menyempit⁽¹¹⁾. Berdasarkan latar belakang tersebut maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi dan permasalahan pada pasien PPOK khususnya pada efikasi diri dan nilai *Peak Expiratory flow rate* (PEF).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik responden penelitian.

Karateristik	Frekuensi	Persentase
Usia		
Dewasa	4	13.3
Lansia	26	86.7
Jenis Kelamin		
laki-laki	22	73.3
perempuan	8	26.7
Pendidikan		
≤ SLTP	24	80
≥ SLTP	6	20
Pekerjaan		
Non PNS	28	93.3
PNS	2	6.7
Tinggi badan		
142-155	15	50
156-169	15	50
IMT		
kurang (<18.5)	14	46.7
Normal (≥ 18.5)	16	53.3
Σ rokok		
Ringan (0-200)	12	40
Sedang (200-600)	18	60
Lama penyakit		
≤ 2 tahun	20	66.7
> 2 tahun	10	33.3

Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia lansia sebesar 86.7% (26 responden), sebagian besar jenis kelamin laki-laki 73.3% (22 responden), sebagian besar

tingkat pendidikan \leq SLTP (SD,SLTP) 80% (24 responden), sebagian besar pekerjaan non PNS 93.3% (28 responden), tinggi badan merata yaitu tinggi badan 142-155 cm 50% (15 responden). Sebagian besar berat badan dalam IMT normal 53.3% (16 responden), kategori merokok sebagian besar kategori sedang (200-600 batang rokok). Sebagian besar lama penyakit \leq 2 tahun 66.7% (20 responden).

Tabel 2. Efikasi diri pada pasien PPOK.

Efikasi diri	Frekuensi	Persentase
baik	4	13.3
tidak baik	26	86.7

Berdasarkan tabel 2. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki efikasi diri yang tidak baik yaitu 86.7% (26 responden). Persepsi efikasi diri mengacu pada berapa banyak keyakinan seseorang dapat melakukan tindakan untuk menghadapi situasi tertentu⁽⁵⁾. Menurut teori *health belief model* (HBM) jika seseorang hanya memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu tanpa adanya efikasi diri yang tinggi maka kecil kemungkinan seseorang tersebut akan melakukan tindakan atau perilaku tersebut⁽¹²⁾. Efikasi diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengelola penyakit kronis secara mandiri, karena

menentukan seseorang untuk memulai atau tidak dalam melakukan perawatan⁽¹³⁾.

Banyak pasien PPOK yang kehilangan rasa kontrol terhadap penyakit dan kehidupan mereka. Pasien PPOK dengan gejala batuk, produksi dahak yang meningkat dan sesak nafas dapat menurunkan kepercayaan kemampuan mereka untuk menghindari kesulitan bernafas selama terlibat dalam kegiatan tertentu dengan kemampuan yang minimal. Sebagai akibat dari efikasi diri yang rendah tersebut beberapa pasien memilih tidak beraktifitas meskipun secara fisik mereka mampu untuk melakukannya⁽¹⁴⁾.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efikasi diri pasien PPOK adalah tingkat pendidikan dimana proses pembentukan efikasi diri adalah melalui proses kognitif⁽¹⁵⁾. Tingkat pendidikan responden mayoritas berada dalam tingkat pendidikan yang rendah (SD dan SLTP) sehingga dapat berpengaruh terhadap efikasi diri yang dimiliki. Pasien dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki efikasi diri dan perawatan diri yang lebih baik. Hal ini terjadi karena mereka lebih matang terhadap perubahan pada dirinya sehingga lebih mudah menerima pengaruh positif dari luar termasuk informasi kesehatan yang diperoleh⁽¹⁶⁾.

Tabel 3. Peak Expiratory Flow rate (PEF) pada pasien PPOK.

Nilai PEF	Frekuensi	Persentase
< 50% (Zona merah)	27	90
50-80% (Zona kuning)	3	10

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui sebagian besar responden memiliki nilai %PEF<50% sebesar 90% (27 responden) yang merupakan kategori zona merah dan adanya tanda klinis terjadinya penyempitan saluran nafas besar dimana pada normalnya nilai %PEF berada pada rentang nilai >80%-100%.

Nilai PEF pada pasien PPOK menggambarkan seberapa berat obstruksi yang terjadi pada pasien tersebut⁽⁹⁾. Akibat adanya obstruksi yang terjadi pada saluran pernafasan terutama saat ekspirasi mengakibatkan terperangkapnya udara di bagian distal paru sehingga paru menjadi kolaps. Adanya *air trapping* mengakibatkan penurunan ventilasi alveolus yang ditandai dengan penurunan PO₂ (hipoksemia) dan peningkatan PCO₂ (hiperkapnia) dalam darah⁽¹⁷⁾.

Terjadinya hipoksemia, hipoksia dan hiperkapnia akan menyebabkan terjadinya asidosis respiratorik sehingga meningkatkan proses pernafasan dan penggunaan otot-otot

bantu pernafasan⁽⁷⁾. Hipoksia yang terjadi di dalam tubuh akan menyebabkan hipoksia terhadap otot juga, sehingga akan terjadi metabolisme anaerob yang dapat menghasilkan asam laktat. Peningkatan asam laktat dalam tubuh akan menyebabkan kelelahan otot. Kelelahan otot yang terjadi di saluran pernafasan dapat menurunkan nilai PEF⁽⁹⁾.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai PEF adalah usia. Rata-rata usia responden termasuk dalam rentang usia lansia. Nilai PEF akan semakin berkurang dengan bertambahnya usia seseorang yang dapat dibuktikan dari tabel prediksi nilai PEF. Fungsi paru akan terus menurun sesuai bertambahnya usia seseorang karena dengan meningkatnya usia maka kerentanan terhadap penyakit akan bertambah karena sistem biologis manusia akan menurun secara perlahan dan terjadi penurunan elastisitas dinding dada⁽¹⁸⁾.

Perubahan struktur pernafasan seseorang dimulai pada usia dewasa pertengahan. Bertambahnya usia akan menyebabkan elastisitas dinding dada, elastisitas alveoli dan kapasitas paru mengalami penurunan serta terjadi penebalan kelenjar bronkial⁽⁹⁾. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan mudah terjadi infeksi pada saluran pernafasan sehingga memicu

munculnya mukus yang dapat mengobstruksi saluran pernafasan. Obstruksi yang terjadi pada saluran pernafasan dapat menurunkan nilai dari PEF⁽¹⁸⁾.

Riwayat merokok juga menjadi pencetus penurunan PEF pada responden. Semakin banyak jumlah batang rokok yang dihisap dan semakin lama menjadi perokok akan semakin besar resiko mengalami PPOK. Kandungan zat nikotin dalam rokok dapat menurunkan fungsi sel epitel saluran pernafasan sehingga memicu terjadinya peradangan dan pengeluaran mukus yang berlebih sehingga mengakibatkan obstruksi jalan nafas⁽⁹⁾.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yang semuanya adalah perokok dan mempunyai riwayat merokok dengan kriteria sedang yaitu 200-600 batang pertahun. Kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan fungsi pernafasan pada seseorang. Semakin banyak jumlah batang rokok yang dihisap dan semakin lama riwayat merokok akan semakin besar resiko mengalami PPOK⁽⁹⁾.

Tinggi badan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi fungsi paru⁽⁹⁾. Tinggi badan memiliki korelasi positif dengan nilai PEF. Bertambah tingginya seseorang maka arus puncak ekspirasi akan bertambah besar. Seseorang yang memiliki tubuh tinggi maka

fungsi ventilasi parunya lebih tinggi dibanding dengan orang yang bertubuh pendek⁽⁹⁾.

KESIMPULAN

Sebagian besar responden memiliki efikasi diri yang tidak baik sebesar 86.7% (26 responden) dimana nilai skor efikasi diri tidak baik yaitu < 99 dan sebagian besar responden memiliki nilai %PEF<50% sebesar 90% (27 responden) yang merupakan kategori zona merah dan adanya tanda klinis terjadinya penyempitan saluran nafas besar dimana pada normalnya nilai %PEF berada pada rentang nilai >80%-100%.

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi institusi pendidikan dan institusi rumah sakit tentang efikasi diri dan nilai *Peak expiratory flow rate* (PEF) agar dapat mengintegrasikan dampak dari rendahnya nilai efikasi diri dan nilai PEF pada pasien PPOK. Diharapkan pengkajian tentang efikasi diri pasien PPOK dapat ditambahkan sebagai pengkajian faktor psikososial pada asuhan keperawatan. Pengkajian tingkat keyakinan pasien pada ekspektasi efikasi diri diperlukan untuk meningkatkan perilaku perawatan diri dan kualitas hidup pada pasien dengan penyakit kronis khususnya PPOK.

KEPUSTAKAAN

1. Vestbo, Jorgen, et al. "Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary." *American journal of respiratory and critical care medicine* 187.4 (2013): 347-365.
2. Ambrosino, Nicolino, and Massimiliano Serradori. "Comprehensive Treatment of Dyspnoea in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients." University Hospital of Pisa: Long Termhealth Care (2006).
3. Depkes RI. Pedoman pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronis(PPOK). Direktorat Jenderal pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Jakarta. (2008).
4. Garrod, Rachel, Johanna Marshall, and Fiona Jones. "Self efficacy measurement and goal attainment after pulmonary rehabilitation." *The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease* 3.4 (2008): 791-796.
5. Bentsen, Signe Berit, et al. "Self-efficacy as a predictor of improvement in health status and overall quality of life in pulmonary rehabilitation—an exploratory study." *Patient education and counseling* 81.1 (2010): 5-13.
6. Kalisa, Cindi. Muswardi Rosra dan Ranni Rahmayanthi. Peningkatan Efikasi Diri Siswa Dalam Belajar Dengan Menggunakan Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas X SMA 3 Negeri Bandar Lampung. 2012.
7. Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Volume 1. Edisi 8. Jakarta: EGC. . 2007.
8. Price, S.A & Wilson. *Patofisiologi konsep klinik proses-proses penyakit*. Buku 2. Edisi 6. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC. (2006).
9. Guyton, A. C., & Hall, J. E. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 11. Jakarta : EGC. 2007.
10. Bentsen, et al. (2010) Self-efficacy as a predictor of improvement in health status and overall quality of life in pulmonary rehabilitation an exploratory study. *Patient Educations*. 81(1):5-13.[http:// www. Ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/20356](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20356),
11. Siregar, Febrina Zulhidayati. Perbandingan Arus Puncak Ekspirasi Sebelum dan Sesudah Latihan Fisik pada Anak Obesitas dan Tidak Obesitas. MS thesis. 2008.
12. Kara, M & Asti, T. Effect of education on self-efficacy of Turkish patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Patient Education and Counselling* 55, 114–120.

- onlinelibrary. wiley. com/ doi/ 10.1111.
(2004)
13. Rini, I.S. "Hubungan antara efikasi diri dengan kualitas hidup pasien penyakit paru obstruksi kronis dalam konteks asuhan keperawatan Di RS Paru Batu dan RSU dr." Saiful Anwar Malang Jawa Timur. (2011).
14. Kara, M., & Alberto, J. Family support, perceived self-efficacy and self-carebehaviour of Turkish patients with chronic obstructive pulmonary disease. 2006.
15. Ariani, Yesi. "Hubungan antara motivasi dengan efikasi diri pasien DM tipe 2 dalam konteks asuhan keperawatan di RSUP. H. Adam Malik Medan." (2011).
16. Wu, Shu-Fang Vivienne, et al. "Self-efficacy, outcome expectations and self-care behaviour in people with type 2 diabetes in Taiwan." *Journal of clinical nursing* 16.11c (2007): 250-257.
17. Potter, P. A., & Perry, A. G. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik, Volume 2. Edisi 4.* Jakarta: EGC. 2005
18. Novarin, Christina, Murtaqib Murtaqib, and Nur Widayati. "Pengaruh Progressive Muscle Relaxation terhadap Aliran Puncak Ekspirasi Klien dengan Asma Bronkial di Poli Spesialis Paru B Rumah Sakit Paru Kabupaten Jember " *Pustaka Kesehatan* 3, no. 2 (2015): 311-318.