

Esti Wijayanti. (2011). Hubungan tingkat depresi dengan tingkat kemampuan aktivitas dasar sehari-hari (ADS) pada lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Yogyakarta.

Karya tulis Ilmiah Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pembimbing :

Shanti Wardaningsih, M.Kep., Sp. Jiwa

INTISARI

Depresi adalah suatu perasaan sedih yang sangat mendalam, yang bisa terjadi setelah kehilangan seseorang atau mengalami peristiwa menyedihkan lainnya. Depresi di kalangan lansia yang tinggal dipanti werdha cenderung mengarah pada kondisi kronis, yang berakibat terganggunya fungsi organ sehingga akan muncul disabilitas fungsional.. munculnya disabilitas fungsional akan berdampak pada aktivitas dasar sehari-harinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat depresi dengan tingkat kemampuan aktivitas dasar sehari-hari (ADS) pada lanjut usia yang tinggal di PSTW Budi Luhur Yogyakarta

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitik* dengan desain *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan kepada 37 lanjut usia. Pengambilan data dengan menggunakan kuisioner GDS dan *Barthel index*. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret-Mei 2011. Data yang diperoleh kemudian diuji dengan menggunakan uji statistik *spearman's Rank*.

Hasil penelitiannya yaitu tingkat depresi pada lanjut usia di PSTW Budi Luhur Yogyakarta sebagian besar adalah tidak depresi yaitu 23 (62,2%), depresi ringan 13 (35,1%) dan depresi sedang sampai berat 1 (2,7%). Tingkat kemampuan ADS adalah sebagian besar ketergantungan ringan 20 (54,1%), mandiri 16 (43,2%), ketergantungan berat 1 (2,7%) dan tidak ada lanjut usia yang mengalami ketergantungan total. Nilai *Sparman Rho* ($p= 0,023$) dan nilai ($r= - 0,372$)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat depresi dengan tingkat kemampuan aktivitas dalam sehari-hari (ADS) di PSTW Budi Luhur Yogyakarta.

Esti Wijayanti. (2011). Relationship between level of depression with basic daily activities in elderly people at Budi Luhur Elderly Social Institution of Yogyakarta. School of Nursing. Muhammadiyah University of Yogyakarta

Pembimbing :

Shanti Wardaningsih, M.Kep., Sp. Jiwa

ABSTRACT

Depression is a very deep feeling of sadness, which can occur after the loss of someone or experiencing other distressing events. Depression among the elderly living at elderly social institution tends to become chronic condition which causes organ functional disorders and it makes functional disability that affects basic daily activities.

The research focused to know the relationship between level of depression with basic daily activities in elderly people at Budi Luhur Elderly Social Institution of Yogyakarta.

The study was quantitative approach and sectional design. It was done to 37 elderly. Data were obtained through questionnaire of GDS and Barthel Index from March to May 2011 and analyzed with Spearman's Rank statistical test.

Result of research is level of depression at Budi Luhur Elderly Social Institution of Yogyakarta is normal or not depression 23 elderly (62,2%), moderate depression 13 elderly (35,1%) and medium to serious in 1 elderly (2,7%). Mostly, level of basic daily activity ability at Budi Luhur Elderly Social Institution of Yogyakarta is mild dependence 20 elderly (54,1%), independent 16 elderly (43,2%), and no elderly who experience total dependence with ($p=0,023$) and ($r= -0,372$)

The conclusion of this study is there is relationship between level of depression with basic daily activities of the elderly people at Budi Luhur Elderly Social Institution of Yogyakarta.

Keywords: elderly, depression, basic daily activities