

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai tingkat kelengkapan pengisian formulir dan adekuasi hasil apusan *Pap smear* antara dokter umum dengan dokter spesialis obstetri-ginekologi setelah dibaca dan dianalisis menggunakan program statistik dapat disimpulkan bahwa :

1. Kelengkapan pengisian formulir kelompok dokter umum lebih baik daripada kelompok dokter spesialis obstetri-ginekologi.
2. Jumlah sel ektoserviks pada apusan *Pap smear* kelompok dokter umum lebih adekuat daripada kelompok dokter spesialis obstetri-ginekologi.
3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara adekuasi jumlah sel endoserviks, hasil fiksasi, dan distribusi antara dokter umum dengan dokter spesialis obstetri-ginekologi.

B. Saran

1. Perlu diadakan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar dan mencakup populasi yang lebih luas (tidak hanya terbatas di satu

2. Perlu diketahui perilaku klinisi dalam mengambil sampel dan membuat sediaan apusan *Pap smear* serta latar belakang keilmuan dan pengalaman kerja antar klinisi untuk menilai ada atau tidaknya hubungan kedua hal tersebut terhadap adekuasi apusan *Pap smear*.
3. Perlu diadakan pelatihan keterampilan rutin pengambilan sampel dan pembuatan apusan *Pap smear*, serta adanya umpan balik atau audit untuk hasil adekuasi apusan.
4. Perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai hubungan tingkat kelengkapan formulir dan adekuasi apusan *Pap smear* terhadap kemaknaan klinis pasien.