

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada neonatus BBLC KB dan neonatus BBLK CB yang lahir dan dirawat di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2007, didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Dari 52 neonatus BBLC KB terdapat tiga neonatus (2.9%) saja yang terdiagnosis sepsis neonatorum.
2. Dari 52 neonatus BBLK CB, terdapat empat neonatus (3.8%) yang terdiagnosis sepsis neonatorum.
3. Tidak terdapat perbedaan kejadian sepsis yang bermakna antara neonatus berat badan lahir cukup kurang bulan (BBLC KB) dan neonatus berat badan lahir kurang cukup bulan (BBLK CB).

(*Chi Square*=0.153, *df*=1, *p*>0.05).

B. Saran

Masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang mempelajari perbedaan kejadian sepsis antara neonatus BBLC KB dan neonatus BBLK CB, yang dapat dicapai pada lingkup subyek yang berbeda dengan mengikutsertakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian sepsis neonatorum, sehingga generalisasi hasil penelitian dapat dilakukan pada cakupan yang lebih luas.