

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan hematokrit dan trombosit terhadap luaran maternal dan perinatal pada kasus preeklamsia berat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014-2017, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hematokrit dan trombosit dengan selisih penurunan tekanan darah ibu pada kasus preeklamsia berat dan nilai APGAR bayi yang dilahirkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai hubungan hematokrit dan trombosit terhadap luaran maternal dan perinatal pada kasus preeklamsia berat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2014-2017, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Sebaiknya penelitian dilakukan dalam jumlah sampel yang lebih besar dan ikut memasukkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, baik dari luaran maternal seperti riwayat hipertensi sebelumnya maupun

luaran perinatal seperti proses persalinan, agar didapatkan hasil yang lebih akurat.

2. Bagi institusi atau lembaga

Diharapkan pihak Rumah Sakit dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu pertimbangan dalam hal kebijakan atau program yang berhubungan dengan pencegahan atau penatalaksanaan ibu dengan preeklamsia dan bayi yang dilahirkan.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai preeklamsia berat, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian asfiksia pada bayi, serta faktor yang mempengaruhi penurunan tekanan darah pada ibu hamil saat mengalami preeklamsia berat. Sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya preeklamsia berat dan atau komplikasi yang disebabkan oleh preeklamsia.