

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pola dan evaluasi penggunaan antibiotik untuk pengobatan ISPA pada pediatrik di Instalasi Rawat Inap RSUD Kab Bangka Tengah periode 2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Antibiotik yang paling banyak diresepkan oleh dokter adalah seftriakson (74%), sementara ampisilin (4%), gentamisin (2%), kombinasi seftriakson dengan gentamisin (16%), dan kombinasi ampisilin dengan gentamisin (4%).
2. Pola penggunaan yang diresepkan oleh dokter memenuhi kesesuaian berdasarkan jenis antibiotik yang digunakan (76%), lama pemberian (100%) , cara pemberiaan (100%), frekuensi pemberian (2.56%), dosis yang diberikan (100%), dan penggunaan 2 jenis antibiotik (0%) .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan bagi pembaca dan juga peneliti selanjutnya:

1. Perlu adanya *guidline* khusus penggunaan antibiotik di RSUD Bangka Tengah.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan catatan asuhan keperawatan sebagai data pendukung pada rumah sakit yang menggunakan metode distribusi obat Unit Dose Dispensing (UDD).
3. Perlu penelitian lebih lanjut di instalasi rawat inap RSUD Bangka Tengah dengan pasien yang lebih banyak dan cakupan yang lebih luas meliputi pola penggunaan antibiotik yang rasional dan waspada efek samping dengan metode prospektif.