

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Angka kejadian *plebitis* didapatkan sejumlah 5 kasus dengan persentase 8,3% dari 60 responden dalam penelitian ini
2. Hasil analisis data dengan *Pearson Chi-Square test*, didapatkan nilai $p=0,610$ ($<0,005$) yang artinya tidak terdapat pengaruh pemberian antibiotik intravena terhadap kejadian *plebitis* di rawat inap RSUD Panembahan Senopati Bantul

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang perlu dijadikan pertimbangan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Rumah Sakit
 - a. Mengingat masih ada 8,3% pasien rawat inap dari 4 bangsal yang diobservasi mengalami kejadian *plebitis*, maka saran untuk tenaga medis khususnya perawat diharapkan perlu mengevaluasi lagi tindakan pencegahan dan penanganan

kejadian *plebitis*. Tindakan pencegahan ini bisa salah satunya mempertimbangkan berbagai macam hal dalam yang terkait dengan peningkatan risiko *plebitis*

- b. Tim *surveillance* infeksi nosocomial rumah sakit diharapkan lebih rutin lagi melakukan evaluasi angka kejadian *plebitis* dan juga evaluasi terjadinya komplikasi dari pemberian terapi intravena pada pasien rawat inap untuk mempertahankan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.
- c. Tenaga medis khususnya profesi dokter diharapkan lebih bijak dalam pemberian obat-obatan intravena untuk pasien rawat inap. Salah satunya dalam pemberian antibiotic, diharapkan sesuai dengan indikasi medis dan diagnosis pasien.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut penggunaan antibiotic jenis lain atau obat-obatan intravena lain yang berpotensi besar menimbulkan kejadian *phlebitis*.