

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa respon yang terjadi pada pasien penyakit jantung koroner terhadap terapi pasca intervensi koroner perkutan yaitu gejala restenosis sebanyak (70,77%), terdiri dari 1 gejala restenosis (43,08%) dan 2 gejala restenosis (27,69%), *lifestyle intervention* yang tidak terkontrol meliputi kolesterol total abnormal (58,62%), kolesterol LDL abnormal (93,10%), kolesterol HDL abnormal (72,41%), trigliserida abnormal (70,69%), tekanan darah abnormal (72,22%), dan HbA1c abnormal (50%) serta *adverse drug reaction* (4,62%).

#### **B. Saran**

##### 1. Pihak Rumah Sakit

Rekam medik pasien sebaiknya ditulis dengan lengkap.

##### 2. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan menggunakan metode prospektif dan pengoptimalan evaluasi dengan melakukan wawancara kepada pasien dan dokter untuk menggali informasi lebih dalam mengenai respon yang dialami serta pengobatan yang diberikan kepada pasien.