

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat hubungan antara anemia pada ibu hamil trimester II dengan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta dengan nilai $p = 0,006$ dan *Odds ratio* = 4,200.
2. Tidak Terdapat hubungan antara anemia pada ibu hamil trimester III dengan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta dengan nilai $p = 0,617$ dan *Odds ratio* = 1,284.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai variabel pengganggu dalam penelitian ini dan membuat perbandingan agar dapat diketahui mengenai besaran faktor yang menjadi resiko pada ibu hamil yang mengalami kelahiran BBLR sehingga dapat menjadi acuan atau referensi untuk pencegahan kasus BBLR.

2. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dapat memberikan terapi yang tepat maupun melakukan pencegahan sedini mungkin pada Ibu hamil dengan resiko melahirkan dengan BBLR serta sebagai upaya preventif untuk menurunkan angka kejadian morbiditas dan mortalitas akibat kasus BBLR.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu hamil akan pentingnya pencegahan pada kasus kelahiran dengan BBLR serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Ibu hamil yang beresiko ataupun tidak dalam ketepatan terapi anemia sebagai upaya pencegahan terjadinya kelahiran dengan BBLR. Sehingga diharapkan menurunkan angka kejadian anemia pada ibu hamil maupun kejadian BBLR.