

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian perbandingan Pre-eklampsia pada Ibu hamil dengan riwayat hipertensi dan tanpa riwayat hipertensi terhadap keadaan bayi lahir adalah sebagai berikut

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara preeklampsia dengan riwayat hipertensi dan tanpa riwayat hipertensi terhadap kejadian BBLR. ( $p=0,000$ ,  $PR=5,785$ ,  $95\% CI=2,159-15,499$ )
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara preeklampsia dengan riwayat hipertensi dan tanpa riwayat hipertensi terhadap kejadian prematuritas. ( $p=0,000$ ,  $PR=18,000$ ,  $95\% CI=3,915-82,751$ )
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara preeklampsia dengan riwayat hipertensi dan tanpa riwayat hipertensi terhadap kejadian asfiksia neonatorum. ( $p=0,000$ ,  $PR=11,183$ ,  $95\% CI=3,121-40,069$ )

#### **B. Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah

1. Bidang Kesehatan

Bagi tenaga kesehatan (bidan dan dokter) dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil untuk menghindari maupun mendeteksi terjadinya komplikasi pada keadaan bayi lahir dari Ibu yang menderita Pre-eklampsia.

## 2. Masyarakat

Bag masyarakat khususnya ibu hamil disarankan untuk rutin melakukan kunjungan ANC kehamilan di layanan kesehatan, sehingga dapat diketahui secara dini diagnosis Pre-eklampsia dan risiko komplikasi pada keadaan bayi lahirnya.

## 3. Peneliti lain

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian terkait Pre-eklampsia dengan riwayat hipertensi dan tanpa riwayat hipertensi terhadap keadaan bayi lahir. Peneliti selanjutnya diharap untuk menambah jumlah sampel.