

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian Perbandingan Proporsi Reaksi Lokal BCG antara Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Bayi dengan Berat Lahir Cukup (BBLC) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat disimpulkan :

- 1) Terdapat perbedaan yang bermakna kemunculan reaksi lokal BCG antara kelompok bayi dengan berat lahir rendah dengan kelompok bayi dengan berat lahir cukup.
- 2) Terdapat perbedaan yang bermakna kemunculan reaksi lokal BCG pada faktor lain yaitu faktor yang dibedakan berdasarkan usia kehamilan dan usia imunisasi.

B. SARAN

Saran didasarkan dari keterbatasan penelitian ini dan ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pengaruh faktor berat lahir terhadap reaksi lokal BCG. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengendalikan faktor berupa teknik pemberian imunisasi yang mampu mempengaruhi hasil kemunculan reaksi lokal BCG dengan cara melakukan standarisasi pada pemberi imunisasi BCG. Standarisasi tersebut dilakukan dengan menentukan

syarat untuk pemberi imunisasi BCG berupa sertifikat yang membuktikan bahwa pemberi imunisasi telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara dan teknik pemberian imunisasi BCG yang diberikan oleh badan atau institusi resmi.