

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran Oral Kandidiasis pada pengguna gigi tiruan lepasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi jenis Oral Kandidiasis pada pengguna gigi tiruan lepasan tertinggi adalah Kandidiasis Eritematosa Kronik sebanyak 38 orang (49,35%) .
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi Oral Kandidiasis terendah adalah Kandidiasis Hiperplastik kronik sebanyak 2 orang (2,60%) .
3. Prevalensi Oral Kandidiasis pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.
4. Berdasarkan lama pemakaian, prevalensi Oral Kandidiasis pada pemakaian \geq 1 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan yang \leq 1 tahun.
5. Berdasarkan jenis gigi tiruan, prevalensi lebih banyak ditemukan lesi Oral Kandidiasis pada pengguna GTL daripada GTSL.
6. Tingginya prevalensi Oral Kandidiasis terutama Kandidiasis Eritematosa disebabkan oleh Oral Hygiene subyek yang buruk, perawatan gigi tiruan tidak maksimal, dan jarang melepas gigi tiruan terutama malam hari.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor risiko terbesar terjadinya Oral Kandidiasis.
2. Perlu dilakukan edukasi pada pengguna gigi tiruan tentang pentingnya merawat gigi tiruan dengan baik, menjaga kebersihan mulut dan pemeriksaan rongga mulut secara berkala.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan pembagian wilayah di provinsi DIY.