

Zulfikar R (2014). Hubungan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) Dengan Angka Kejadian Diare Pada Bayi Usia 0 – 6 Bulan di Kabupaten Merauke

Pembimbing : Falasifah Ani Yuniarti, S.Kep., Ns., MAN., HNC

INTISARI

Latar Belakang Bayi yang menerima makanan pendamping ASI (MP ASI) sebelum usia 6 bulan menyebabkan resiko terjadinya diare 17 kali lebih besar dari pada bayi yang menerima makanan pendamping ASI (MP ASI) setelah usia 6 bulan. Kab. Merauke tahun 2010, 92,4% bayi berusia kurang dari 6 bulan telah diberikan MP ASI dan 2.366 kasus diare dialami oleh balita.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian diare pada bayi 0-6 bulan di kabupaten Merauke..

Metode Penelitian menggunakan survey analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian ini ibu yang mempunyai bayi berusia 0-6 bulan yang bertempat tinggal di wilayah kerja PUSKESMAS utama yang berada di Kabupaten Merauke distrik merauke dan Naukenjerai sebanyak 330.. Sampel pada penelitian diambil berjumlah 66 responden dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner.

Hasil penelitian setelah dilakukan uji statistik menggunakan *chi-square* maka di dapatkan hasil uji statistik hubungan antara pemberian MP ASI dengan kejadian diare p-value 0.000 ($p \leq \alpha 0.05$), yang berarti ada hubungan antara pemberian MP ASI dengan kejadian diare di distrik merauke dan distrik naukenjerai. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengendalikan variabel – variabel pengganggu yang muncul dalam penelitian.

Kesimpulan Adanya hubungan antara pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) dengan angka kejadian diare pada bayi usia 0 – 6 bulan di Distrik Naukenjerai dan Distrik Merauke Kab.Merauke.

Kata Kunci : Makanan Pendamping ASI, Diare

Zulfikar R (2014). The Relationship Between Giving Complementary Breast Feeding (MP ASI) with the Diarrhea to Infants aged 0 – 6 Month in Merauke District

Adviser : Falasifah Ani Yuniarti, S.Kep., Ns., MAN., HNC

ABSTRACT

Background Infants who received complementary feeding (MP ASI) before the age of 6 months increases the risk of occurrence diarrhea was 17 times greater than in infants who received complementary breast feeding (MP ASI) after 6 months of age. In 2010, 92,4% of infants before 6 months has been given MP ASI and 2.366 infants got the diarrhea.

The purpose of the study was to know the relationship between Giving Complementary Breast Feeding (MP ASI) with the diarrhea on the baby 0-6 month in Merauke District

Method of this research was analytic survey with cross sectional approachment. The population of this research was mothers with baby 0-6 month who lived at work area of major Society Health Centre (Puskesmas) in Merauke district and Naukenjerai with the number are 330. Total sample in this research was 66 respondents with the purposive sampling technique. Data was collected by distributing the questioner.

The result of this research tested by chi-square and p value is 0,000 ($p \leq \alpha 0, 05$), it means there is a relationship between giving alternative food of ASI with the diarrhea in Merauke District and Naukenjerai. Expectation for the next researcher can control the confounding variables that appears in research.

Conclusion any Relationship Between Giving Complementary Breast Feeding (MP ASI) with the Diarrhea to Infants aged 0 – 6 Month in Merauke District

keyword : Complementary Breast Milk, Diarrhea