

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah bayi yang menderita diare di distrik merauke dan distrik naukenjerai pada bayi usia 0-6 bulan sebanyak 39 bayi (59,1%).
2. Jumlah bayi yang diberikan makanan pendamping ASI pada usia 0 – 6 bulan sebanyak 45 bayi (68,2 %).
3. Adanya hubungan antara pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) dengan angka kejadian diare pada bayi usia 0 – 6 bulan di Distrik Naukenjerai dan Distrik Merauke Kab.Merauke.

B. Saran

1. Bagi Ilmu Keperawatan

Bagi praktek ilmu keperawatan anak, agar lebih mengembangkan wawasan dan pengalaman yang didapatkan di perkuliahan kemudian dipraktikkan di masyarakat dengan cara pendidikan kesehatan kepada masyarakat mengenai pemberian makanan pendamping ASI yang tepat dan pendampingan program ASI eksklusif.

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pendampingan mengenai pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja agar ibu-ibu mengerti akan manfaat ASI.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengendalikan variabel-variabel pengganggu yang muncul dalam penelitian, sehingga mencegah terjadinya bias dalam hasil penelitian serta dapat melakukan analisis faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan diare.