

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekonsiliasi obat, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian berikut ini :

1. Prevalensi terjadinya DRP potensial pada pasien DM tipe 2 melalui proses rekonsiliasi obat di Puskesmas Sewon 1 Bantul adalah sebesar 82,86%.
2. Setelah dilakukan evaluasi, maka jenis DRP potensial pada pasien DM tipe 2 melalui proses rekonsiliasi obat di Puskesmas Sewon 1 Bantul dibagi menjadi tiga jenis yaitu :
 - a. Ketidakpatuhan pasien sebesar 44,82%
 - b. *Adverse drug reaction* sebesar 20,7%
 - c. Interaksi obat potensial sebesar 34,48%

B. Saran

Sehubungan dengan hasil rekonsiliasi obat, maka saran yang bisa penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi responden penelitian

Disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan tenaga kesehatan seperti dokter maupun apoteker terkait dengan pengobatan sendiri yang dilakukan di rumah, seperti saat mengonsumsi jamu, produk herbal ataupun

terapi alternatif. Selain itu juga disarankan untuk lebih mematuhi aturan pengobatan agar tercapai *outcome* terapi yang diharapkan.

2. Bagi institusi Puskesmas

Disarankan untuk meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk mengurangi kejadian DRP potensial dan mengoptimalkan penggunaan rekonsiliasi obat untuk mengetahui pengobatan yang diterima pasien ataupun yang dikonsumsi secara mandiri di rumah.

3. Bagi peneliti lain

Disarankan untuk lebih memperluas subjek penelitian dari sarana pelayanan kesehatan.