

Sari, A.S. (2014). Hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal di Klinik Utama Asri Medical Center Yogyakarta dan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Pembimbing:

dr. Supriyatiningssih, Sp.OG., M.Kes

INTISARI

Ruptur perineum adalah robeknya perineum pada saat janin lahir. Robekan ini sifatnya traumatis karena perineum tidak kuat menahan regangan pada saat janin lewat. Paritas merupakan faktor dari ibu yang dapat menyebabkan ruptur perineum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal di Klinik Utama Asri Medical Center Yogyakarta dan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Responden dalam penelitian ini adalah ibu bersalin normal terhitung dari bulan Februari – Maret 2014 yang tercatat di rekam medik sebanyak 152 orang. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah uji Fisher test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal ($p = 0.002$).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal di Klinik Utama Asri Medical Center Yogyakarta dan RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Kata Kunci:*Paritas, Kejadian Ruptur Perineum*

Sari, A.S. (2014).*The Relation Between Parity With Incidence Of Rupture Perineal During Vaginal Birth At The Clinic Of Asri Medical Center In Yogyakarta And District Hospital Panembahan Senopati Bantul.*

Adviser:

dr. Supriyatiningih, Sp.OG., M.Kes

ABSTRACT

Rupture perineal is the tear of the perineal at the time of the fetus born. The tear is only traumatic because the perineal could not hold a strain upon when a fetus passes. The parity is factor of mother that can cause rupture perineal.

This study aims to know the relation between parity with incidence of rupture perineal during vaginal birth at the clinic of Asri Medical Center in Yogyakarta and District Hospital Bantul Panembahan Senopati.

This study was a quantitative descriptive study with cross sectional approach. Respondents in this study were mothers vaginal birth as of February – March 2014, which was recorded in the medical record as many as 152 people. Sampling technique was purposive sampling techniques. Analysis of test used is the Fisher test.

The results showed that significant relation between parity with incidence of rupture perineal during vaginal birth ($p = 0,002$).

Based on the results, it can be concluded that there is relation parity with incidence of rupture perineal during vaginal birth at the clinic of Asri Medical Center in Yogyakarta and District Hospital Bantul Panembahan Senopati.

Keyword: Parity, Incidence Rupture Perineal