

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Klinik Utama Asri Medical Center Yogyakarta dan RSUD Panembahan Senopati Bantul pada bulan Februari – Maret 2014, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status paritas yang paling banyak melahirkan adalah primipara (58,6%).
2. Status paritas primipara sebagian besar mengalami ruptur perineum (58,6%).
3. Ada hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum pada persalinan normal di Klinik Utama Asri Medical Center Yogyakarta dan RSUD Panembahan Senopati Bantul ($p = 0,002$).

B. Saran

1. Bagi Klinik Utama Asri Medical Center Yogyakarta dan RSUD Panembahan Senopati Bantul

Diharapkan untuk lebih meningkatkan konseling dan memberikan informasi kepada ibu hamil khususnya pada primigravida mengenai kondisi pada ibu yang dapat menyebabkan ruptur perineum dan tanda-tanda persalinan yang berisiko mengalami kejadian ruptur perineum, sehingga meminimalkan terjadinya ruptur perineum.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kejadian ruptur perineum dengan menggunakan sampel yang lebih besar, metode penelitian yang lebih baik sehingga lebih banyak lagi faktor risiko ruptur perineum yang dapat diteliti.