

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan bidan 60% hingga 100% dan sikap bidan 50% hingga 70% pada siklus I dalam penggunaan APD di kamar bersalin Rumah Sakit “JIH”
2. Perilaku bidan dalam menggunakan APD di kamar bersalin Rumah Sakit “JIH” pada siklus I 14% hingga 43% dan pada siklus II 43% hingga 86%.
3. Peningkatann penggunaan APD dikamar bersalin setelah action research sebesar 43% hingga 86%.
4. Faktor-faktor yang berhubungan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD di kamar bersalin Rumah Sakit “JIH” adalah pengadaan *reward*, pemusatan fasilitas APD dalam kotak dan pengadaan kacamatan goggles dengan hidrofил.

B. Saran

1. IPCN Rumah Sakit memprogramkan pelatihan untuk meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan penggunaan APD.

2. IPCN melaksanakan rekomendasi tentang pengadaan APD yang nyaman dan tersentral.
3. Penggunaan APD berdasarkan faktor penularan penyakit dan resiko HAIS.
4. Manajemen sebaiknya melakukan dan evaluasi kegiatan PPI secara terjadwal. Selain itu pihak IPCN juga disarankan untuk memberikan *training* ulang berdasarkan prinsip *need-based training* dengan menyelenggarakan asesmen dan FGD sebelumnya untuk mengetahui kebutuhan atau kesulitan lapangan yang dialami oleh bidan.